

EFEECTO DE UN NUEVO APÓSITO ANTIOXIDANTE EN LA CICATRIZACIÓN DE ÚLCERAS ISQUÉMICAS



Osakidetza

BILBO-BASURTU
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

OBJETIVOS




METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Demostrar la eficacia del nuevo apósito antioxidante **REOXCARE®** para activar cicatrización en heridas crónicas de tórpida evolución.

- Mujer de 71 años que padece isquemia arterial crónica femoropoplítea de grado IV revascularizada en febrero 2015
 - Se tratan tres lesiones en EII con tejido esfacelar y tamaño acumulado de 193 cm²
 - Se aplica **REOXCARE®** directamente sobre el lecho de la lesión **sin desbridamiento previo**, precisando un foam secundario y cura cada 3-4 días
 - Semanalmente se evalúan la evolución de las heridas.
- Desde el inicio se constata la activación de lesiones, mejoría del lecho, disminución del exudado y progresión de los bordes. Al mes de uso se observa reducción de tamaño acumulada de 46,6 cm²



- Mónica Arizmendi Pérez
- Mariana Sánchez de Luna Rodríguez
- Elena López García
- Mónica Moreno Martín

Unidad de Úlceras por Presión y
Heridas Crónicas. Organización Sanitaria
Integrada Bilbao Basurto

- Los componentes antioxidantes de **REOXCARE®** (cúrcuma y N-acetilcisteína) han reducido los niveles tóxicos de los radicales libres de oxígeno permitiendo superar la fase inflamatoria.
- La matriz laminar de origen vegetal (harina de semillas de algarrobo) ha gestionado el exudado.
- Las propiedades bacteriostáticas de **REOXCARE®** han contribuido a la prevención de infecciones potenciales.